

NEWS2 National Early Warning Score2

| Fysiologiske parametre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Respirasjonsfrekvens (per minutt) | ≤8 | | 9-11 | 12-20 | | 21-24 | ≥25 |
| SpO ₂ Skala 1(%) | ≤91 | 92-93 | 94-95 | ≥96 | | | |
| SpO ₂ Skala 2* (%) | ≤83 | 84-85 | 86-87 | 88-92 ≥93 på luft | 93-94 på oksygen | 95-96 på oksygen | ≥97 på oksygen |
| Luft eller oksygen? | | Oksygen | | Luft | | | |
| Systolisk blodtrykk (mmHg) | ≤90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | | | ≥220 |
| Puls (per minutt) | ≤40 | | 41-50 | 51-90 | 91-110 | 111-130 | ≥131 |
| Bevissthetsnivå** | | | | A | | | CVPU |
| Temperatur (°C) | ≤35,0 | | 35,1-36,0 | 36,1-38,0 | 38,1-39,0 | ≥39,1 | |

*SpO₂ Skala 2 brukes kun ved kjent hyperkapnisk respirasjonssvikt, verifisert ved blodgass.
Lege må dokumentere i pasientens journal at Skala 2 skal brukes.

** Bevissthetsnivå:

A= Alert (våken)

C= New confusion (nyoppstått forvirring)

V= Voice (reagerer på tiltale)

P= Pain (reagerer på smertestimulering)

U= Unresponsive (reagerer hverken på tiltale eller smertestimulering)

© Royal College of Physicians 2017



Respons

Veiledende respons på pasientens skår

Kontakt MIG hele døgnet på tlf: 64260

| NEWS (Skår) | Overvåkningsfrekvens | Respons | Fare for sykehusmortalitet |
|-----------------------|--|--|----------------------------|
| 0 | Minimum hver 12. time. | Fullstendig NEWS ved hvert observasjonstidspunkt. | Lav |
| Totalt 1-4 | Minimum hver 4-6. time. | Sykepleier på post skal vurdere behov for: <ul style="list-style-type: none">- Kliniske tiltak- Økt overvåkningsfrekvens/-nivå- Legekontakt | |
| Skår 3 i én parameter | Minimum én gang per time, eller etter forordning fra lege. | Sykepleier på post skal informere ansvarlig lege og sammen med denne vurdere behov for: <ul style="list-style-type: none">- Kliniske tiltak- Økt overvåkningsnivå- Kontakt med mobil intensivgruppe (MIG) | Lav-middels |
| Totalt 5 eller høyere | Minimum én gang per time, eller etter forordning fra lege. | Sykepleier på post skal omgående informere ansvarlig lege og sammen med denne vurdere behov for: <ul style="list-style-type: none">- Kliniske tiltak- Økt overvåkningsnivå- Kontakt med mobil intensivgruppe (MIG) | Middels |
| Totalt 7 eller høyere | Kontinuerlig overvåkning av vitale funksjoner, eller etter forordning fra lege | Sykepleier på post skal umiddelbart informere (spesialistkompetent) ansvarlig lege og sammen med denne ta kontakt med MIG. MIG og postpersonalet bestemmer sammen kortsiktig plan og vurderer behov for: <ul style="list-style-type: none">- Omgående kliniske tiltak- Overflytning til overvåkningsavdeling | Høy |

OBS: En lav skår utelukker ikke alvorlig sykdom. NEWS2 er et supplerende hjelpemiddel til observasjonskompetanse og skjønn.

Ved mistanke om infeksjon og NEWS2 \geq 5:
Vurdér om pasienten kan ha sepsis og igangsett isåfall umiddelbar behandling.

© Akershus universitetssykehus